

BROCHURE POUR LES PATIENTS



(vaporisateur nasal d'épinéphrine)
2 mg / 0,1 mL

neffy[®] est un vaporisateur nasal d'épinéphrine indiqué chez les adultes et les enfants pesant au moins 30 kg pour le traitement d'urgence des réactions allergiques, y compris l'anaphylaxie causée par des piqûres ou morsures d'insectes, des aliments, des médicaments et à d'autres allergènes, ainsi que l'anaphylaxie d'origine inconnue ou induite par l'exercice physique.

Consultez la notice du médicament destinée aux patients pour obtenir les instructions complètes.

Comment reconnaître l'anaphylaxie

Utilisez *neffy*[®] immédiatement dès l'apparition des premiers signes d'anaphylaxie après une exposition à un allergène – les symptômes peuvent inclure:

- Éruption cutanée (ex. urticaire) ou démangeaisons de la peau
- Essoufflement ou respiration sifflante
- Accélération du rythme cardiaque
- Perte de contrôle de la vessie
- Nausées, vomissements, diarrhée ou crampes abdominales
- Gonflement des lèvres, de la gorge, de la langue, des mains ou des pieds
- Enrouement
- Bouffées de chaleur
- Sentiments d'appréhension ou convulsions



neffy[®] doit être administré immédiatement par le patient (ou par un soignant) en cas d'urgence allergique.

Assurez-vous que vous, votre enfant, les membres de la famille, les personnes qui s'en occupent, vos collègues et ses enseignants sachez comment et quand utiliser *neffy*[®].


Pour connaître les effets indésirables et leur signalement, veuillez consulter le verso de la brochure.



Stockage et manipulation

Chaque dispositif *neffy*[®] à usage unique contient une dose d'épinéphrine et est présenté dans un emballage blister accompagné d'un mode d'emploi.

Ayez toujours 2 vaporisateurs *neffy*[®] avec vous, au cas où une deuxième dose serait nécessaire.



Conservez *neffy*[®] entre 15 °C et 30 °C. Ne pas congeler.

En cas de congélation accidentelle, le vaporisateur nasal ne fonctionnera pas. Laissez-le décongeler pendant au moins une heure. Ne l'utilisez pas si le contenu est encore congelé ou s'il n'est pas complètement décongelé.



Vérifiez régulièrement la date de péremption et remplacez votre *neffy*[®] avant cette date.



(vaporisateur nasal d'épinéphrine)
2 mg / 0,1 mL

Mode d'emploi pour les patients et les soignants

Ce guide de formation a pour but de vous conseiller sur la marche à suivre en cas d'anaphylaxie. Les patients et les soignants doivent se familiariser avec ce guide afin de pouvoir reconnaître les symptômes de l'anaphylaxie et savoir comment administrer le vaporisateur nasal *neffy*® 2 mg.

Lorsque vous êtes prêt à l'utiliser, retirez le vaporisateur nasal *neffy*® de son emballage. Ouvrez l'emballage blister pour retirer le vaporisateur nasal.




1. Tenez

Tenez le vaporisateur nasal comme indiqué. Tenez-le avec votre pouce placé sur le bas du piston et un doigt de chaque côté de la buse.

NE tirez PAS et NE poussez PAS sur le piston.

NE PAS tester ni vaporiser au préalable ; chaque vaporisateur nasal ne contient qu'une seule dose.



2. Placez

Insérez l'embout du vaporisateur nasal dans une narine. Maintenez la buse droite dans le nez, pointée vers votre front.

3. Appuyez

Appuyez fermement sur le piston jusqu'à ce qu'il se relève et que la dose soit administrée dans la narine.

NE PAS incliner le vaporisateur nasal vers les parois internes ou externes du nez. Évitez de renifler pendant et après l'administration.

Si du liquide s'écoule du nez, surveillez l'apparition de symptômes. Il peut être nécessaire d'administrer une deuxième dose de *neffy*®.

Après avoir utilisé *neffy*®

Après avoir utilisé *neffy*®, consultez immédiatement un médecin afin d'obtenir un traitement d'urgence pour l'allergie (anaphylaxie). Avant de recevoir *neffy*®, votre professionnel de santé doit vous expliquer quand appeler les secours.

Lors de l'utilisation de *neffy*®

Si vous êtes un parent ou un soignant administre *neffy*®, assurez-vous que l'appareil est tenu correctement afin de permettre une administration adéquate. Si nécessaire, les patients doivent s'allonger avec les pieds surélevés. En cas d'essoufflement, ils doivent s'asseoir. Les patients inconscients doivent être placés sur le côté, en position de sécurité, afin de réduire le risque d'étouffement. Si les symptômes persistent, restez, si possible avec une autre personne jusqu'à l'arrivée des secours médicaux.

Surveillez les symptômes du patient

Si les symptômes continuent de s'aggraver ou réapparaissent après environ 5 minutes, ou en cas d'erreur d'administration, utilisez un nouveau vaporisateur nasal *neffy*® pour administrer une deuxième dose dans la même narine que la première, et demandez une assistance médicale d'urgence.

ALK-Abello Pharmaceuticals Inc. Tous droits réservés. *neffy*® et le logo *neffy*® sont des marques commerciales ou des marques déposées d'ARS Pharmaceutical Operations, Inc. et sont utilisés ici avec autorisation.



Qu'est-ce que *neffy*® ?

Le matériel éducatif sur *neffy*®, y compris une copie des renseignements sur le médicament destinés aux patients et le mode d'emploi, est disponible en ligne à l'adresse www.neffy.ca



Les effets secondaires peuvent inclure une irritation de la gorge, des picotements dans le nez, des maux de tête, une gêne nasale, une sensation d'excitation excessive, de nervosité ou d'anxiété, des picotements, de la fatigue, des tremblements, un écoulement nasal, des démangeaisons nasales, des éternuements, des douleurs abdominales, des douleurs aux gencives ou aux dents, un engourdissement de la bouche, une congestion nasale, des étourdissements, des nausées et des vomissements.

Ce ne sont pas tous les effets secondaires possibles que vous pourriez ressentir en utilisant *neffy*®. Si vous ressentez des effets secondaires qui ne sont pas mentionnés ici, informez-en votre professionnel de la santé.

Signalement des effets secondaires

Vous pouvez signaler tout effet secondaire suspecté ou tout problème de qualité lié au produit en appelant le 1-800-663-0972. Vous pouvez également signaler les effets indésirables liés à tout produit directement à Santé Canada en visitant le site Web du Programme Canada Vigilance ou en appelant le 1-866-234-2345.

Utilisez *neffy*® dès que vous remarquez des symptômes d'anaphylaxie.

